

КЛЕШЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ

УСЛОВИЯ ЗАРАЖЕНИЯ

- Посещение леса
 - Клещ сидит на травинках или деревьях.
 - Не может летать или прыгать.
 - Может цепляться за жертву.
 - Может упасть на неё.
- Занесение клещей животными
 - собаками и кошками после прогулки.
- Занесение клещей людьми
 - на одежду, с цветами, ветками.



СПОСОБЫ ЗАРАЖЕНИЯ



- Укус клеша.
- Раздавливание и втирание присосавшегося клеша.
- Употребление в пищу инфицированного сырого козьего и коровьего молока.

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ



- Носите в лесу специальную одежду
 - Куртку или рубашку с длинным рукавом, с плотно застегнутыми воротом и манжетами.
 - Головной убор.
 - Высокую закрытую обувь, в которую можно заправить штаны.
- Используйте репелленты
 - обрабатывайте одежду и открытые участки тела специальными защитными препаратами.
- Осматривайте себя
 - не пренебрегайте само и взаимоосмотрами на приivalsах и по возвращению домой.
- Пейте кипяченое молоко
- Сделайте прививку против клещевого энцефалита!



ЧТО ТАКОЕ ЭНЦЕФАЛИТ?

Энцефалит – вирусное природно-очаговое заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы.

Источниками вируса являются более 100 видов животных – крупный рогатый скот, птицы, грызуны и др.

ПЕРЕНОСЧИКИ ВИРУСА



размер
в зависимости от возраста
3-25 мм

Среда обитания:

в лесах, на полянках, в парках и других местах, где имеется трава и кустарники.

Активность:

теплое время года, с апреля по октябрь, пик активности – июнь-июль.

Как нападает:

Клещ незаметно вливается в кожу жертвы, выделяет со слизью анестетизирующее и разжижающее кровь вещество, обезболивающее процесс присасывания. Человек может длительное время не ощущать прикрепившегося клеша.

Через несколько часов после укуса голова насекомого полностью погружается под кожу человека, а брюшко раздувается от выпитой крови.



3-4 мм



40-500 мг

Вирус сохраняется в течение всей жизни клеша!

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- Инкубационный период
длится 1,5 - 2 недели.
- Поражение коры головного мозга
длится несколько дней.
- Воспаление мозга
Симптомы: головные боли, рвота, потеря сознания [вплоть до комы], температура тела 39-40°.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УКУСЕ КЛЕША

- Используйте нить для извлечения клеша
Прончную нитку завязать в узел как можно ближе к хоботку клеша, затем извлечь клеша, медленно раскачивая и подтягивая его вверх.
- Если на коже осталась черная точка
Во время извлечения клеша оторвалась его головка или хоботок. Обработайте место укуса спиртом или 5% раствором йода и, затем, удалите головку стерильной иглой (предварительно проокрашенной на огне) также, как удалите обычную занозу.
- Продезинфицируйте место укуса
Как можно быстрее обработайте место укуса клеша любым дезинфицирующим средством – 3-5% раствором земляничного, 5% раствором йода, спиртом и т.п.
- Тщательно вымойте руки с мылом
- Обратитесь к врачу
Клеща необходимо исследовать на наличие инфекции. Поместите клеша в стеклянный флакон вместе с слегка намоченным кусочком ваты и плотно закройте крышкой. Храните в холодильнике не более 2 суток.

- Брать клеша голыми пальцами, раздавливать!
- Делать резкие движения – клещ разорвется!
- Использовать масло – оно закупорит дыхательные отверстия, и клещ может умереть, так и оставшись в коже!